

コード ナンバリング	ge001-01、ge002-01 1	ge004-01、ge005-01 4	ge006-03 6	ge007-03 7	ge008-03 8	ge009-03 9	ge010-03 10	ge011-02 11
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	ハーセプチン weekly	ハーセプチン 3weeks	タキソール	タキソール・ ハーセプチンweekly(初回)	タキソール・ハーセプチンweekly	タキソール・ ハーセプチン3weeks(初回)	タキソール・ ハーセプチン3weeks	タキソール
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>4mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>2mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b>	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>4mg/kg</b> )	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>2mg/kg</b> )	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>8mg/kg</b> )	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ( <b>6mg/kg</b> )	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 <b>メインルート 全開で</b>	生食 50mL 1瓶 <b>メインルート 全開で</b>	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	生食 500mL 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.2と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	生食 500mL 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.2と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	生食 500mL 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.2と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	生食 500mL 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.2と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/ml</b> ) <b>調製時ボンピング必要</b>
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	<b>休薬完了day7</b>		<b>休薬完了day7</b>	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	
手技		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day8、15は、休薬週
4 薬剤		<b>休薬完了day21</b>		<b>休薬完了day7</b>	<b>休薬完了day7</b>			<b>休薬完了day21</b>
手技						day8,15	day8,15	
5 薬剤						カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタミンコ-75錠服用</b>	
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤						生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/ml</b> )	
手技						持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	
7 薬剤						<b>休薬完了day21</b>	<b>休薬完了day21</b>	
手技								
8 薬剤								
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge012-02 12	ge013-02 13	ge015-01 14	ge016-01 15	ge017-01 16	ge018-01 17	ge019-01 18	ge026-05 19	
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール名	タキソテール・ハーセプチン 3weeks(初回)	タキソテール・ ハーセプチン3weeks	FEC 100	FEC 75	ナベルピン	ナベルピン ハーセプチン3weeks(初回)	ナベルピン ハーセプチン3weeks	IFL	
投与順序	1 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(6mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツマブ(6mg/kg)	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (250mg/ml) Rp.2と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ポンピング必要	生食100mL 1瓶 エビルピシン注(100mg/ml)	生食100mL 1瓶 エビルピシン注 (75mg/ml)		生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	フルオウラシル(500mg/ml) Rp.1投与60分後 上ルートより	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢	静脈注射緩徐に	
4 薬剤			ラクテック500mL 1袋 フルオウラシル注 (500mg/ml) エンドキサン注(500mg/ml)	ラクテック500mL 1袋 フルオウラシル注 (500mg/ml) エンドキサン注(500mg/ml)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で			生食100mL 1瓶 イリノテカン (80mg/body) Rp.3終了後 上ルートより	
手技	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	day8	day8	持続点滴末梢(60分)	
5 薬剤	休業完了day21	休業完了day21			生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋	
手技			day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	
6 薬剤			休業完了day21	休業完了day21		生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	day1~15 計3回	
手技					day15は、休業週	持続点滴末梢	持続点滴末梢	day22は休業	
7 薬剤					休業完了day21			休業完了day7	
手技						day15は、休業週	day15は、休業週		
8 薬剤						休業完了day21	休業完了day21		
手技									
9 薬剤									
手技									
10 薬剤									
手技									
11 薬剤									
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									

コード ナンバリング	ge027-02 20	ge034-01 23	ge039-01 24	ge044-01 26	ge045-01 27	ge046-01、ge047-01 28	ny049-01 30
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコル名	イリノテカン	ナベルピンBiweekly	カンプト(A法)weekly	ナベルピン ハーセプチン2weeks	ジェムザール(乳腺)	ジェムザール(乳腺) ハーセプチン3weeks	OT
投与順序	1 薬剤	1 薬剤		1 薬剤			1 薬剤
薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で		生食 250mL 1袋 トラスツズマブ(4mg/kg)			カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	day1,8,15	持続点滴末梢(90分)	day1,8	day1	持続点滴末梢(15分)
2 薬剤	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/mf) 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/mf)
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(45分)
3 薬剤			生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/mf)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/mf)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ポンピング必要
手技	day8は休薬	day8は休薬	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約60分)
4 薬剤	休薬完了day14	休薬完了day7				生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/mf)	生食 50mL 1瓶
手技			day22は休薬	day8は休薬	day15は休薬	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)
5 薬剤			休薬完了day28	休薬完了day14	休薬完了day21		
手技						day8	day8,15は休薬
6 薬剤						カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day21
手技						持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤						生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/mf)	
手技						持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤							
手技						day15は休薬	
9 薬剤						休薬完了day21	
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny050-01	ny051-01,ny052-01	ny056-01	ny057-01	ny058-01,ny059-01	ny060-01	ny061-01
入院・外来	31	32	34	35	36	38	39
ルート	入院・外来 ケモセーフ (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	アブラキサシ	アブラキサシ・ ハーセプチン 3weeks	ハラヴェン	イリノテカン・ ハーセプチン	CT・ハーセプチン	ハラヴェン・ハーセプチン	weeklyタキソール・アバスタシ
投与順序	1 薬剤 カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> 下ルートより			生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1,8	day1,8,15	持続点滴末梢	day1,8	day1,15
2 薬剤	生食100mL (52mL/mf) アブラキサシ注(260mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 <b>4mg/kg</b> (30分) day8 なし day15 <b>6mg/kg</b> (30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 <b>6mg/kg</b> (30分) day8 なし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day21	生食100mL (52mL/mf) アブラキサシ注(260mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注(1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサシ注 (600mg/mf)	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤		休薬完了 day21		生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/mf)	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注(1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 100mL 1瓶 アバスタシ (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可
手技			day15は休薬	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤			休薬完了 day21		生食 50mL 1瓶		
手技				day22,29は休薬	持続点滴末梢(15分)	day15は休薬	day8
6 薬剤				休薬完了 day35		休薬完了 day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用 持続点滴末梢(30分)
手技					day8,15は休薬		
7 薬剤					休薬完了 day21		生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)
手技							持続点滴末梢(90分)
8 薬剤							
手技							day22は休薬
9 薬剤							休薬完了 day28
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny063-01 41	ny064-01 42	ny069-01 43	ny070-01 44	ny071-01 45	ny072-01 46	ny073-01 47
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン(8mg/kg)	weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン(6mg/kg)	ハラヴェン・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・ハラヴェン・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・ハラヴェン・ハーセプチン	パージェタ・ハラヴェン・ハーセプチン	パージェタ(初回)・ハーセプチン(初回) 3weeks	パージェタ(初回)・ハーセプチン(初回) 3weeks
1 薬剤							生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body
手技	day1,15	day1,15	day1,8	day1,8	day1,8	day1,8	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ錠服用	トラスツズマブ day1 8mg/kg(90分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 840mg/body(60分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 840mg/body(60分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 420mg/body(60分) day8 なし 認容性 良:60分→30分 短縮	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 8mg/kg(90分) day8 なし	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 6mg/kg(90分) day8 なし 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ day1 6mg/kg(90分) day8 なし 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週
5 薬剤				生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/mf) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	休業完了day21
手技	day8	day8	day15は休業	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	
6 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ(6mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	休業完了day21				
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		day15は休業	day15は休業	day15は休業	
7 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコーワ錠服用		休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
8 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/mf)					
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)					
9 薬剤							
手技	day21は休業	day21は休業					
10 薬剤	休業完了day28	休業完了day28					
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny074-01 48	ny075 49	ny076-01 50	ny077-01 51	ny078-01 52	ny079-01 53	ny080-01 54
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パージェタ(初回)・ハーセプチン 3weeks	パージェタ・ハーセプチン 3weeks	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン	パージェタ・アブラキサン・ ハーセプチン	パージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・タキソール・ ハーセプチン
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body 下ルートより	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body 下ルートより	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可 下ルートより	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可 下ルートより	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタミンコーワ5錠服用
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤			生食100mL (52mL/mf) アブラキサン注(280mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL (52mL/mf) アブラキサン注(280mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL (52mL/mf) アブラキサン注(280mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)
手技	day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21		
手技						day8	day8
6 薬剤						カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
7 薬剤						生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)
手技						持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
8 薬剤							
手技						day15	day15
9 薬剤						カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
10 薬剤						生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/mf)
手技						持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
11 薬剤						休業完了day21	休業完了day21
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny081-01 55	ny082-01 56	ny083-01 57	ny084-01 58	ny085-01 59	ny086-01 60	ny087-01 61
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パージェタ・タキソール・ハーセプチン	パージェタ(初回)・weeklyタキソール・アバスチン・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・weeklyタキソール・アバスチン・ハーセプチン	パージェタ・weeklyタキソール・アバスチン・ハーセプチン	パージェタ(初回)・タキソール・ハーセプチン3weeks(初回)	パージェタ(初回)・タキソール・ハーセプチン3weeks	パージェタ・タキソール・ハーセプチン3weeks
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可				生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(60分)	day1,15	day1,15	day1,15	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.3と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎎f)	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバスチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/㎎f) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/㎎f) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/㎎f) 調製時ポンピング必要
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤							
手技	day8	day8	day8	day8	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週
6 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	休業完了 day21	休業完了 day21	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)			
7 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎎f)	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可			
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)			
8 薬剤		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用			
手技	day15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			
9 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/㎎f)			
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)			
10 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎎f)						
手技	持続点滴末梢(90分)	day21は休業	day21は休業	day21は休業			
11 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day28	休業完了 day28	休業完了 day28			
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							



コード ナンバリング	ny088-01	ny089-01	ny090-01	ny091-01	ny092-01	ny093-01	ny094-01	
	62	63	64	65	66	67	68	
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	
プロトコール名	パージェタ(初回)・ナベルピン ハーセプチン3weeks(初回)	パージェタ(初回)・ナベルピン ハーセプチン3weeks	パージェタ・ナベルピン ハーセプチン3weeks	パージェタ(初回)・ジェムザール・ ハーセプチン3weeks(初回)	パージェタ(初回)・ジェムザール・ ハーセプチン3weeks	パージェタ・ジェムザール・ハーセ プチン3weeks	パージェタ(初回)・CT・ハーセプチ ン(初回)	
1 薬剤 投与順序	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮 可	/		/		生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)					day1
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b>	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	
3 薬剤	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮 可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮 可	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/ml)	
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)	
5 薬剤	/		/		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr <b>調製時ポンピング必要</b>
手技					day8	day8	day8	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	/		/		生食 50mL 1瓶
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)					day8
7 薬剤	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	/	
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
8 薬剤	/		/		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1250mg/ml)	休業完了 day21
手技					day15は、休業週	day15は、休業週	day15は、休業週	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day21	休業完了 day21	/		/		
手技								day15は休業
10 薬剤	/		/		休業完了 day21	休業完了 day21	休業完了 day21	
手技								
11 薬剤	/		/		/		/	
手技								
12 薬剤	/		/		/		/	
手技								
13 薬剤	/		/		/		/	
手技								
14 薬剤	/		/		/		/	
手技								



コード ナンバリング	ny095-01 69	ny096-01 70	ny100-01 71	ny101-01、ny102-01 72	ny103-01 74	ny116-01 75	ny119-01 76
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パージェタ(初回)・CT・ハーセプチン	パージェタ・CT・ハーセプチン	カドサイラ	TCbH(初回)、TCbH	TCb	EC(2weeks)療法	EC(3weeks)療法
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 注射用水20mL 1A 蒸留水は溶解用 カドサイラ 3.6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回、8mg/kg(90分) 2回目以降、6mg/kg(30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注 (75mg/mf) 調製時ボンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注 (75mg/mf) 調製時ボンピング必要	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	生食100mL 1瓶 エビルピシン注(90mg/mf) 全開で	生食100mL 1瓶 エビルピシン注(90mg/mf) 全開で
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/mf)	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/mf)	休業完了 day21	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg		生食100mL 1瓶 エンドキサン注(600mg/mf)	生食100mL 1瓶 エンドキサン注(600mg/mf)
手技	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(45分)		持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/mf) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要			休業完了 day21	休業完了 day14	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢(約60分)		day8,15は、休業週			
6 薬剤	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶		休業完了 day21			
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)					
7 薬剤							
手技	day8,15は休業	day8,15は休業					
8 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day21					
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny126-01	ny132-01	ny133-01	ny134-01	ny136-01	ny138-01	ny139-01
	入院・外来 77	入院・外来 78	入院・外来 79	入院・外来 80	入院・外来 81	入院・外来 82	入院・外来 83
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	キイトルーダ(3週毎)	テセントリク+アブラキサン	CMF療法	エンハーツ	キイトルーダ(6週毎)	TCbHP(P初・H初)	TCbHP(P初・H)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)			カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	生食 250mL 1袋 パージェタ 840mg/body
手技	持続点滴末梢(30分)	day1.15	day1.8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食250mL 1袋 テセントリク (840mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ 短縮可 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 8mg/kg	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮 可
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	休薬完了 day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食50mL 1瓶 メントレキセート注(40mg/mf) 全開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶 エンハーツ注(5.4mg/kg) 注射用水20mL 1A 認容性 良→2回目以降30分へ 短縮可 遮光必要	休薬完了 day42	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤		生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	生食 100mL 1瓶 フルオウラシル(600mg/mf) 全 開で	5%ブドウ糖100mL 1瓶		5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/mf) 調製時ポンピング必要	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注(75mg/mf) 調製時ポンピング必要
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤			休薬完了 day28	休薬完了 day21		生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg
手技		day8				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	エンドキサン錠 100mg/mf 14日間	エンハーツ調製後は点滴バッ グを遮光する			
手技		持続点滴末梢(30分)				day8.15は、休薬週	day8.15は、休薬週
7 薬剤		生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄		調製後4時間以内に投与 病棟のときは連絡時、上記伝える こと		休薬完了 day21	休薬完了 day21
手技		day22は、休薬週					
8 薬剤		休薬完了 day28		エンハーツ400mgを超えると 注射用水2A必要になるので 処方修正してもらうこと			
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny140-01 84	ny144-01 85	ny145-01 86	ny146-01 87	ny147-01 88	ny148-01 89	ny149-01 90
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	TCbHP(P・H)	キイトルーダ(3週毎)+パクリタキセル	パクリタキセル(90mg/m <sup>2</sup> )	キイトルーダ(6週毎)+パクリタキセル	キイトルーダ(3週毎)+アブラキサン	アブラキサン(100mg/m <sup>2</sup> )	キイトルーダ(6週毎)+アブラキサン
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/m <sup>2</sup> )	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/m <sup>2</sup> )	休薬完了 day7	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/m <sup>2</sup> )	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより	休薬完了 day7	生食100mL (20mL/m <sup>2</sup> ) アブラキサン注(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 上ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注 (75mg/m <sup>2</sup> ) 調製時ポンピング必要	休薬完了 day7	3投1休で投与	休薬完了 day7	休薬完了 day7		休薬完了 day7
手技	持続点滴末梢(60分)						
5 薬剤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC6) MAX900mg	キイトルーダ(3週毎)と パクリタキセル(3投1休)のレジメン 乳腺126, 144, 145を組み合わせ て使用	乳腺144、乳腺146の一部	キイトルーダ(6週毎)と パクリタキセル(3投1休)のレジメン 乳腺145, 146を組み合わせ て使用			
手技	持続点滴末梢(30分)						
6 薬剤		乳腺144: day1,43,64(1,7,10週目) 乳腺145: day8,15,29,36,57,71 (2,3,5,6,9,11週目) 乳腺126: day22(4週目)					
手技	day8,15は、休薬週						
7 薬剤	休薬完了 day21						
手技							
8 薬剤							
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny150-01	ny151-01	ny153-01	ny154-01	ny155-01	ny156-01	ny158-01
	91	92	93	94	95	96	97
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	キイトルーダ(3週毎)+GEM+CBDCA	キイトルーダ(6週毎)+GEM+CBDCA	ピラルピシン(週1回法)	イリノテカン+ハーセプチン(初回)	イリノテカン+ハーセプチン	ddPTX療法	キイトルーダ+EC(3weeks)
投与順序	1 薬剤					カイトリル注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタミンコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	day1	day1	day1,8,15	day1,8,15	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 初回、4mg/kg 2回目以降、2mg/kg 認容性良:90分→30分短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性良:90分→30分短縮可	生食 500mL 1袋 バクリタキセル注(175mg/㎡)	アロキシ注バッグ 1袋 アロカリス注 1瓶 デキサート注6.6mg 1.5V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ピノルピン注(25mg/㎡) 生食5mL/Vで溶解 全開で	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day14	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)		生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/㎡)	生食 500mL 1袋 イリノテカン(100mg/㎡)		生食100mL 1瓶 エビルピシン注(90mg/㎡) 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22,29は休薬	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(15分)
5 薬剤	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	休薬完了day35				生食100mL 1瓶 エンドキサン注(600mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		day22	day22		持続点滴末梢(30分)
6 薬剤				生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性良:90分→30分短縮可	生食 250mL 1袋 トラスツズマブ 2mg/kg 認容性良:90分→30分短縮可		休薬完了day21
手技	day8	day8, 22, 29		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢	持続点滴末梢		
8 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)		休薬完了day28	休薬完了day28		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
9 薬剤	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg	生食250mL 1袋 カルボプラチン(AUC 2) MAX300mg					
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)					
10 薬剤	休薬完了day21	休薬完了day42					
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny159-01 98	ny160-01 99
ルート	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	
手技	day1	day1
2 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコ-75T内服	カイトリル注ハック3mg 1袋 アロカリス注 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタミンコ-75T内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/rl)	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/rl)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
5 薬剤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC1.5) MAX225mg	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC5) MAX750mg
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤		
手技	day8,15	day8,15
7 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75T内服	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコ-75T内服
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/rl)	生食 250mL 1袋 バクリタキセル注(80mg/rl)
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
9 薬剤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注(AUC1.5) MAX225mg	休薬完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)	
10 薬剤	休薬完了 day21	
手技		
11 薬剤		
手技		
12 薬剤		
手技		
13 薬剤		
手技		
14 薬剤		
手技		