

コード	gi002-01	gi003-01	gi004-01	gi005-01	gi006-01	gi007-01	gi008-01	gi009-01
ナンバリング	2	3	4	5	6	7	8	9
入院	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院 ケモセーフ(下ルート)
プロトコール名	weekly タキソテール(放射線併用)	Weekly CDDP(40mg/m ²)	Triweekly タキソテール	オブジーボ(2週毎)	アービタックス(初回)	アービタックス	FP+アービタックス療法(初回)	FP+アービタックス療法
投与順序	1 薬剤						day1は10時に投与開始予定	day1は10時に投与開始予定
薬剤	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	テカドロン8mg/日内服 (Day2~4)	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V	day1は10時に投与開始予定	day1は10時に投与開始予定
手技	持続点滴末梢(30分)	day1 持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1 day2~4	day1 day2~4
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (10mg/m ²) 調製時ボンピング必要	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (80mg/m ²) 調製時ボンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに	アロキシ注ハック 1袋 デキササート注6.6mg 1.5V メインルート	生食100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休業完了day7	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート		休業完了day14	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食500mL 1袋 アービタックス(400mg/m ²) 全量500mL Rp.3と同時 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロワシル (800mg/m ²) 全量250mL Rp.3と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)
4 薬剤		グラニセトロン注ハック 1袋 デキササート注6.6mg 1V メインルート	休業完了day21		休業完了day7	休業完了day7	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤		生食500mL 1袋 ランダ (40mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより					生食 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
6 薬剤		マンニトール300mL 1瓶 メインルート					生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/m ²) 全量を500mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)					持続点滴末梢(120分)	day8,15 持続点滴末梢(120分)
7 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート					生食 20mL 1A ラジックス注20mg 1A 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキササート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤		ソルデム1 500mL 1袋 メインルート					生食 500mL 1袋 フルオロワシル(800mg/m ²) Rp.8と同時 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス(250mg/m ²) 全量を250mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)
9 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート					ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより	生食 250mL 1袋 ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
10 薬剤		休業完了day7					ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
11 薬剤		イメンド内服					ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
12 薬剤							ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
13 薬剤								
手技								
14 薬剤							イメンド内服	イメンド内服
手技								

