

コード	kk001-06	kk002-05	kk003-05	kk004-06	kk005-06	kk006-06	kk007-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ シスプラチン・ ジェムザール	ケモセーフ シスプラチン・ ナベルピン	ケモセーフ シスプラチン・ TS-1	ケモセーフ シスプラチン・ カンプト	ケモセーフ シスプラチン・ タキソテール	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ パブラプラチン・ Monthlyタキソール
投与順序 1 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	★TS-1開始時がday1	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 ファモジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にタキソール75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	生食100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/㎡) 全開で	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/㎡)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/㎡)	カイトリル注バッグ3mg 1袋
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/㎡)				
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)
4 薬剤	マンニトールS 200mL	マンニトールS 200mL	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg				
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/㎡) 全量を500mL	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/㎡) 全量を500mL 下ルートより	day8,15は、休業週				
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1袋	休薬完了day21				
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
7 薬剤							カルボプラチンはAUC6に減量 されていても問い合わせ不要
手技	day8	day8	day15,22,29は、休業週	day8,15	day8,15は、休業週	day23	
8 薬剤	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (20mg/㎡) 全開で	休薬完了day35	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休薬完了day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)		持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	イメンド内服	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/㎡)	イメンド内服	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/㎡)	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(90分)	
10 薬剤							
手技	day15は、休業週	day15は、休業週		day22は、休業週		day8,15は、休業週	
11 薬剤	休薬完了day21	休薬完了day21		休薬完了day28		休薬完了day21	
手技							
12 薬剤	イメンド内服	イメンド内服		イメンド内服		イメンド内服	
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk008-03	kk009-04	kk010-03	kk011-03	kk012-03	kk013-03	kk014-03	kk016-03
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコル名	ケモセーフ パラブラチン・ weeklyタキソール	ケモセーフ weeklyパラブラチン・ タキソール・RT	ケモセーフ パラブラチン・ タキソール	ケモセーフ パラブラチン・ ジェムザール	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) パラブラチン・ ラストット	ケモセーフ パラブラチン・ カンブ	ケモセーフ パラブラチン・ TS-1	ケモセーフ タキソール
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/rl) 調製時ポンピング必要	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/ml)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (60mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (40mg/ml)	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 4) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより	生食 500mL 1袋 イリノテカン (40mg/ml)	ソルデム3A500mL 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 2) MAX300mg				ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 2) MAX300mg		5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (60mg/ml)
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	day8	day2,3	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤		休業完了day7	休業完了day21	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	day1~15まで計3コース	休業完了day21	day1~15まで計3コース
手技	day8,15			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day22は、休業週		day22は、休業週
6 薬剤	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 0.5V Rp.1と同時にレスタシノーワ5錠服用	day1~36まで計6コース		生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン (1000mg/ml)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/ml)	休業完了day28		休業完了day28
手技	持続点滴末梢(30分)			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)			
7 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋							
手技	持続点滴末梢(30分)			day15は、休業週	day8,15は、休業週			
8 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注 (60mg/ml)			休業完了day21	休業完了day21			
手技	持続点滴末梢(120分)							
9 薬剤								
手技	day22は、休業週							
10 薬剤	休業完了day28							
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk017-03	kk018-03	kk019-03	kk020-05	kk022-04	kk023-03	kk024-03	kk025-04
	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート プロトコ ル名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
	Triweeklyタキソテール	Biweeklyタキソテール	ジェムザール	ナベルピン	カンプト	カルセド	ハイカムチン	シスプラチン・アリムタ
投与順序 1 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V			カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注1mg筋注
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,8,15	day1,8	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1
2 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/㎡) 調製時ボンピング必要	カイトリル注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 0.5V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	生食 500mL 1袋 イリノテカン (60mg/㎡)	ソルデム3A200mL 1袋 Rp.1と同時	生食 100mL 1瓶 ハイカムチン(1.0mg/㎡)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤			生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/㎡)	生食 50mL 1瓶 ルートキープ用	day1～15まで計3コース	生食 100mL 1瓶 カルセド (40mg/㎡) 全開で Rp.1終了後 持続点滴側管(約10分)	day1～5まで計5コース	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/㎡)
手技	day8,15は、休業週	day8は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴側管	day22は、休業週	持続点滴末梢(約10分)	持続点滴末梢(約10分)	持続点滴末梢(10分)
4 薬剤	休業完了 day21		day1～15まで計3コース	day1～8まで計2コース	休業完了 day7	day1～3	休業完了 day21	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq
手技		day15	day22は、休業週	day15は、休業週				持続点滴末梢(60分)
5 薬剤		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	休業完了 day28	休業完了 day21		休業完了 day21		マンニトールS 200mL
手技		持続点滴末梢(30分)						持続点滴末梢(30分)
6 薬剤		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (35mg/㎡)						生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/㎡) 全量を500mL
手技		持続点滴末梢(90分)						持続点滴末梢(120分)
7 薬剤								ソルデム3A500mL 1袋
手技		day22は、休業週						持続点滴末梢(60分)
8 薬剤		休業完了 day28						
手技								day8,15は、休業週
9 薬剤								休業完了 day21
手技								
10 薬剤								イメンド内服
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk026-03	kk027-03	kk028-02	kk029-03	kk030-02	kk031-02	kk032-01
	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート プロトコ ール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
	Biweekly ジェムザール	Biweekly パラプラチン・ カンプト	アリムタ	パラプラチン・タキソール・ アバステン	アバステン	パラプラチン・ アリムタ	アリムタ・アバステン
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋 注	1 薬剤	1 薬剤	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1 朝 9週毎 メチコパール 注 1mg筋注	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコパール注 1mg筋 注
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1	day1
2 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休薬完了 day14	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	休薬完了 day21	1 薬剤	1 薬剤
手技		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)
4 薬剤			休薬完了 day21	1 薬剤		1 薬剤	1 薬剤
手技		day8は、休薬週		持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤		休薬完了 day14		1 薬剤			休薬完了 day21
手技				持続点滴末梢(90分)		day8,15は、休薬週	
6 薬剤				休薬完了 day21		休薬完了 day21	
手技							
7 薬剤							
手技							
8 薬剤							
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk033-01	kk034-01	kk035-06	kk036-01	kk037-01	kk038-01	kk039-01	kk040-01
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコル名	ケモセーフ パラプラチン・アリムタ・アバスタチン	ケモセーフ アクブラ・タキソテール	ケモセーフ シスプラチン・タキソテール (放射線併用)	ケモセーフ ドセタキセル+サイラムザ	ケモセーフ オプジーボ(2週毎)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤							
薬剤	1週間前より 連日 フオリアミン 0.5mg分1 朝 9週毎 メチコパール 注 1mg筋注	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミン75T内 服	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(240mg/body)		生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可
手技	day1	持続点滴末梢(30分)	day1,8,29,36	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 2.5V 投与中に水分1L摂取	生食250mL 1袋 サイラムザ (10mg/kg) 認容性 良 60分→30分へ 短縮可	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(600mg/mf)	生食 500mL 1袋 アクブラ (100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (40mg/mf) 調製時ポンピング必要	生食 50mL 1瓶 全開で	休業完了 day14	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄	休業完了 day21	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢		持続点滴末梢(30分)		
4 薬剤	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン(AUC 5) MAX750mg	ラクテック500mL 1袋	ソルデム3A500mL 1B 硫酸Mg 8mEq	生理食塩液250mL 1袋 ドセタキセル (60mg/mf) 調製時ポンピング必要		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより		
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)		
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ヘパシスマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ 短縮可	ラクテック500mL 1袋	マンニトールS 200mL	休業完了 day21				
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)			day8,15		
6 薬剤		休業完了 day21	生食 500mL 1袋 ランダ (40mg/mf) 全量を500mL			カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし		
手技	day8,15は、休業週		持続点滴末梢(120分)			持続点滴末梢(30分)		
7 薬剤	休業完了 day21		ソルデム3A500mL 1袋			生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残渣は廃棄		
手技			持続点滴末梢(60分)			持続点滴末梢(30分)		
8 薬剤						休業完了 day21		
手技			day15,22,43は、休業週					
9 薬剤			休業完了 day49					
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								
15 薬剤								
手技								
16 薬剤								
手技								
17 薬剤								
手技								

コード	kk041-01	kk042-01	kk043-01	kk044-01	kk045-01	kk046-01	kk047-01	kk048-01	
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	
プロトコル名	ケモセーフ イミフィンジ	ケモセーフ キイトルーダ・パラプラチン・アリムタ	ケモセーフ キイトルーダ・パラプラチン・Monthlyタキソール	ケモセーフ キイトルーダ・シスプラチン・アリムタ	ケモセーフ キイトルーダ・アリムタ	ケモセーフ テセントリク・パラプラチン・タキソール・アバステン	ケモセーフ テセントリク・アバステン	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) キイトルーダ・カルボプラチン・アブラキサン	
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 イミフィンジ注(10mg/kg)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	1週間前より 連日 フォリアミン 0.5mg分1朝 9週毎 メチコバル注 1mg筋注	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分へ短縮可	
手技	持続点滴末梢(60分)	day1	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1	
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body)	生食 100mL 1袋 ヘハズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 ヘハズマブ(15mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(200mg/body) 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	
3 薬剤	休薬完了 day14	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注ハッグ3mg 1袋	アロキシ注ハッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 2.5V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	アロキシ注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	
4 薬剤	12か月(1年間)で終了	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(175mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	生食 100mL 1瓶 アリムタ注(500mg/mf)	アロキシ注ハッグ3mg 1袋	休薬完了 day21	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	
手技		持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	
5 薬剤		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq	休薬完了 day21	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)		生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	
手技		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(120分)	
6 薬剤				マンニトールS 200mL		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg			
手技		day8,15は、休薬週	day8,15は、休薬週	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(120分)		day8,15	
7 薬剤		休薬完了 day21	休薬完了 day21	生食 500mL 1袋 ランダ (75mg/mf) 全量を500mL		休薬完了 day21		カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技				持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(30分)	
8 薬剤			カルボプラチンはAUC5に減量 されていても問い合わせ不要	ソルデム3A500mL 1袋				生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	
手技				持続点滴末梢(60分)				持続点滴末梢(30分)	
9 薬剤								休薬完了 day21	
手技				day8,15は、休薬週					
10 薬剤				休薬完了 day21					
手技									
11 薬剤				イメンド内服					
手技									
12 薬剤									
手技									
13 薬剤									
手技									
14 薬剤									
手技									
15 薬剤									
手技									
16 薬剤									
手技									
17 薬剤									
手技									

コード	kk049-01	kk050-01	kk051-01	kk052-01	kk053-01	kk054-01	
ルート	入院		入院・外来		入院・外来		
プロトコル名	ケモセーフ		ケモセーフ		ケモセーフ(下ルート)		
	ADOC療法(患者限定)		イミフィンジ維持小細胞		イミフィンジ・シスプラチン・ラステット療法		
投与順序	1 薬剤	イメンド内服	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body)	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより	生食 250mL 1瓶 イミフィンジ注(1500mg/body) 下ルートより 投与中に水分1L摂取	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(480mg/body)
手技		day1	day3	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
2 薬剤	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V 投与中に水分1L摂取	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 100mL 1瓶 フィルターなし	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピジン注 (40mg/mf)	生食 50mL 1瓶 オンコピン (0.6mg/mf) 全開で	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	休薬完了day28	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V フィルターなし	休薬完了day28
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
4 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg 8mEq		ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 5) MAX750mg 下ルートより		5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド (100mg/mf)	
手技	持続点滴末梢(60分)	day4	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	
5 薬剤	マンニトール 200mL	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V			ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより	ソルデム3A500mL 1袋 硫酸マグネシウム 8mEq	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day2,3		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
6 薬剤	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mLに	ラクテック500mL 1袋 メイロン 20mL 1A	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし			マンニトールS 200mL	
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)		day2,3	持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋	生食 100mL 1瓶 エンドキサン注(700mg/mf)	5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)		カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 500mL 1袋 ランダ (80mg/mf) 全量を500mL 下ルートより	
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	
8 薬剤		休薬完了day21			5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	ソルデム3A500mL 1袋	
手技	day2		day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	
9 薬剤	生食 50mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V		休薬完了day21		day8,15は、休薬週	day2,3	
手技	持続点滴末梢(30分)						
10 薬剤					休薬完了day21	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	
手技						持続点滴末梢(30分)	
11 薬剤						5%ブドウ糖500mL 1袋 エトポシド(100mg/mf)	
手技						持続点滴末梢(90分)	
12 薬剤						day8,15は、休薬週	
手技						休薬完了day21	
13 薬剤							
手技							
14 薬剤						イメンド内服	
手技							
15 薬剤							
手技							
16 薬剤							
手技							
17 薬剤							
手技							

コード	kk055-01	kk056-01	kk057-01	kk057-01	kk058-01	kk059-01
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコル名	ケモセーフ キイトルーダ(6週毎)	ケモセーフ オブジーボ+ヤーボイ(マノマ)	ケモセーフ オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day1	ケモセーフ オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA +PTX day22	ケモセーフ オブジーボ+ヤーボイ(非小細胞 肺がん)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし) テセントリク+カルボプラチン+ アブラキサン
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注(400mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(80mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1
2 薬剤	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.2と同時にレスチンコウ75錠服用	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	生食 100mL 1瓶 テセントリク注(1200mg/body) 認容性 良→2回目以降30分 へ短縮可 下ルート
手技	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	休薬完了day42	生食 100mL 1瓶 ヤーボイ注(3mg/kg)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	アロキシ注バッグ3mg 1袋	生食 100mL 1瓶	アロキシ注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技		持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤		生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)	生食 50mL 1瓶 ヤーボイ注(1mg/kg) 生食30mL抜いて調製	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(180分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		休薬完了day21	生食 100mL 1瓶 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mgmg 2.5V Rp.5と同時にレスチンコウ75錠服用	ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg	生食 50mL 1瓶	生食500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg 下ルートより
手技			持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤		4回投与後、オブジーボ単剤へ	アロキシ注バッグ3mg 1袋	休薬完了day21		
手技			持続点滴末梢(30分)		day22	day8,15
7 薬剤			5%ブドウ糖500mL 1袋 パクリタキセル注(200mg/mf)		生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(360mg/body)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技			持続点滴末梢(180分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤			ソルデム3A500mL 1袋 カルボプラチン (AUC 6) MAX800mg		生食 50mL 1瓶	生食100mL (20mL/mf) アブラキサン注(100mg/mf) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技			持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤			休薬完了day21		休薬完了day42	休薬完了day21
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						
15 薬剤						
手技						
16 薬剤						
手技						
16 薬剤						
手技						
17 薬剤						
手技						