

コード ナンバリング	ct001-01 1	ct002-01 2	ct003-01 3	ct004-01 4	ct005-01 5	ct006-01 6
	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ
プロトコール名	レミケード(3mg/kg)	レミケード(5mg/kg)	レミケード(10mg/kg)	エンドキサンパルス	リツキサン(50mg/h)	リツキサン(25mg/h)
投与順序	1 薬剤 生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V	生食500mL 1袋 エンドキサン(500mg/ml)	生食 50mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V	生食 50mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
2 薬剤	生食250mL 1袋 インリキシマブ(3mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	生食250mL 1袋 インリキシマブ(5mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	生食250mL 1袋 インリキシマブ(10mg/kg) 開始1hr→50mL/hr その後1hr→200mL/hr	生食250mL 1袋 メインルート	生食 50mL 1瓶 ポラミン 5mg 1V	生食 50mL 1瓶 ポラミン 5mg 1V
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)
3 薬剤	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	生食 250mL 1袋 1回目 指示確認 2・3回目 2hr 4回目以降 1hr	休薬完了day14	生食 500mL 1袋 リツキサン(375mg/ml) 開始30分→50mL/hr 2回目以降、忍容性...	生食 500mL 1袋 リツキサン(375mg/ml) 開始1時間→25mL/hr 2回目以降、忍容性...
手技	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢		持続点滴末梢	持続点滴末梢
4 薬剤	休薬完了day14	休薬完了day14	休薬完了day14		休薬完了day1	休薬完了day1
手技						
5 薬剤					内服、解熱剤予防的に内服 することあり。	内服、解熱剤予防的に内服 することあり。
手技						
6 薬剤						《リツキサンの投与速度》 【初回】 開始1時間→25mL/hr その後1時間→100mL/hr その後→200mL/hr
手技						
7 薬剤						【2回目以降、忍容性あり】 ①か②のどちらかで投与可能 ①開始1時間→100mL/hr その後→200mL/hr
手技						
8 薬剤						②主治医の指示があれば、 以下の速度可 開始1時間→200mL/hr その後→400mL/hr 参照：重篤な心疾患なし、採 血リンパ球数5000/μL未満
手技						
9 薬剤						
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						
15 薬剤					腎内1、血液4と共通	血液15と共通
手技						