

コード ナンバリング	ge001-01、ge002-01	ge004-01、ge005-01	ge006-03	ge007-03	ge008-03	ge009-03	ge010-03
	1	4	6	7	8	9	10
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	従来通り(シール)	従来通り(シール)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	休薬完了 day7		生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシノー75錠服用
手技		day8.15は、休薬週	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤		休薬完了 day21	休薬完了 day7	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)
手技				持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤				休薬完了 day7	休薬完了 day7		
手技						day8.15	day8.15
5 薬剤						カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシノー75錠服用
手技						持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
6 薬剤						生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(80mg/㎡)
手技						持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
7 薬剤						休薬完了 day21	休薬完了 day21
手技							
8 薬剤							
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ge011-02 入院・外来 11	ge012-02 入院・外来 12	ge013-02 入院・外来 13	ge015-01 入院・外来 14	ge016-01 入院・外来 15	ge017-01 入院・外来 16	ge018-01 入院・外来 17	ge019-01 入院・外来 18
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	タキソテール	タキソテール・ハーセブチン 3weeks(初回)	タキソテール・ ハーセブチン3weeks	FEC 100	FEC 75	ナベルピン	ナベルピン ハーセブチン3weeks(初回)	ナベルピン ハーセブチン3weeks
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセブチン(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 ハーセブチン(6mg/kg)	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 ハーセブチン(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 ハーセブチン(6mg/kg)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食100mL 1瓶 エビルピシン注(100mg/㎡)	生食100mL 1瓶 エビルピシン注(75mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
3 薬剤		5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル(75mg/㎡) 調製時ボンピング必要	ラクテック500mL 1袋 フルオロラシル注(500mg/㎡) エンドキサン注(500mg/㎡)	ラクテック500mL 1袋 フルオロラシル注(500mg/㎡) エンドキサン注(500mg/㎡)		生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用
手技	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8	持続点滴末梢	持続点滴末梢
4 薬剤	休業完了day21					生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で		
手技		day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	持続点滴末梢(5分)	day8	day8
5 薬剤		休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス(25mg/㎡) 全開で
手技						持続点滴末梢	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
6 薬剤				イメンド内服	イメンド内服		生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用
手技						day15は、休業週	持続点滴末梢	持続点滴末梢
7 薬剤						休業完了day21		
手技							day15は、休業週	day15は、休業週
8 薬剤							休業完了day21	休業完了day21
手技								
9 薬剤								
手技								
10 薬剤								
手技								
11 薬剤								
手技								
12 薬剤								
手技								
13 薬剤								
手技								
14 薬剤								
手技								

コード ナンバリング	ge026-05	ge027-02	ge034-01	ge039-01	ge044-01	ge045-01	ge046-01、ge047-01
	19	20	23	24	26	27	28
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	IFL	イリノテカン	ナバルピンBiweekly	カンプト(A法) weekly	ナバルピン ハーセプチン2weeks	ジェムザール(乳腺)	ジェムザール(乳腺) ハーセプチン3weeks
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤
薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 レボホリナート (250mg/㎡) Rp.2と同時 下ルートより	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	生食 250mL 1袋 ハーセプチン (4mg/kg)	生食 250mL 1袋 ハーセプチン	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、8mg/kg 2回目以降は、6mg/kg
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	day1,8,15	持続点滴末梢(90分)	day1,8	day1
薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時	生食 500mL 1袋 イリノテカン (80mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/㎡) 全開で	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン (1250mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)
薬剤	フルオロウラシル (500mg/㎡) Rp.1投与60分後 上ルートより			生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/㎡)	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン (1250mg/㎡)	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	静脈注射緩徐に	day8は休業	day8は休業	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
薬剤	生食100mL 1瓶 イリノテカン (80mg/body) Rp.3終了後 上ルートより	休業完了 day14	休業完了 day7				生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン (1250mg/㎡)
手技	持続点滴末梢(60分)			day22は休業	day8は休業	day15は休業	持続点滴末梢(30分)
薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋			休業完了 day28	休業完了 day14	休業完了 day21	
手技	持続点滴末梢(30分)						day8
薬剤	day1~15 計3回						カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	day22は休業						持続点滴末梢(30分)
薬剤	休業完了 day7						生食 100mL 1瓶 ジェムシタピン (1250mg/㎡)
手技							持続点滴末梢(30分)
薬剤							
手技							day15は休業
薬剤							休業完了 day21
手技							
薬剤							
手技							
薬剤							
手技							
薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny049-01 30	ny050-01 31	ny051-01.ny052-01 32	ny056-01 34	ny057-01 35	ny058-01.ny059-01 36	ny060-01 38
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコル名	CT	アブラキサン	アブラキサン・ ハーセプチン 3weeks	ハラヴェン	イリノテカン・ ハーセプチン	CT・ハーセプチン	ハラヴェン・ハーセプチン
投与順序	1 薬剤 カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、 <b>8mg/kg</b> 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> 下ルートより			生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回は、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降は、 <b>6mg/kg</b> (30分)	
手技	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	day1.8	day1.8,15	持続点滴末梢	day1.8
2 薬剤	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/1V)	生食100mL (52mg/mL) アブラキサン注(280mg/1V) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセプチン day1 <b>4mg/kg</b> (30分) day8 なし day15 <b>6mg/kg</b> (30分)	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセプチン day1 <b>6mg/kg</b> (30分) day8 なし
手技	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/1V) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr <b>調製時ポンピング必要</b>	休業完了day21	生食100mL (52mg/mL) アブラキサン注(280mg/1V) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注(1.4mg/1V) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 (600mg/1V)	カイトリル注3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(約60分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	生食 50mL 1瓶		休業完了day21		生食 500mL 1袋 イリノテカン (100mg/1V)	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (75mg/1V) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr <b>調製時ポンピング必要</b>	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注(1.4mg/1V) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技	持続点滴末梢(15分)			day15は休業	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢
5 薬剤				休業完了day21		生食 50mL 1瓶	
手技	day8.15は休業				day22.29は休業	持続点滴末梢(15分)	day15は休業
6 薬剤	休業完了day21				休業完了day35		休業完了day21
手技						day8.15は休業	
7 薬剤						休業完了day21	
手技							
8 薬剤							
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny061-01 39	ny063-01 41	ny064-01 42	ny069-01 43	ny070-01 44	ny071-01 45	ny072-01 46
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコル名	ケモセーフ weeklyタキソール・アバステン	ケモセーフ weeklyタキソール・アバステン・ ハーセプチン(8mg/kg)	ケモセーフ weeklyタキソール・アバステン・ ハーセプチン(6mg/kg)	ケモセーフ ハラヴェン・ハーセプチン(初回)	ケモセーフ パージェタ(初回)・ハラヴェン・ ハーセプチン(初回)	ケモセーフ パージェタ(初回)・ハラヴェン・ ハーセプチン	ケモセーフ パージェタ・ハラヴェン・ハーセプ チン
投与順序	1 薬剤						
手技	day1,15	day1,15	day1,15	day1,8	day1,8	day1,8	day1,8
2 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	ハーセプチン day1 8mg/kg(90分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 840mg/body(60分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 840mg/body(60分) day8 なし	生食 250mL 1袋 パージェタ day1 420mg/body(60分) day8 なし 認容性 良→60分→30分 短縮
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
3 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 ハーセプチン day1 8mg/kg(90分) day8 なし	生食 250mL 1袋 ハーセプチン day1 6mg/kg(90分) day8 なし 認容性 良→90分→30分 短縮	生食 250mL 1袋 ハーセプチン day1 6mg/kg(90分) day8 なし 認容性 良→90分→30分 短縮
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/rl) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤					生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/rl) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/rl) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ	生食 50mL 1瓶 ハラヴェン静注 (1.4mg/rl) 全開で(2~5分) 投与後、生食フラッシュ
手技	day8	day8	day8	day15は休業	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢
6 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用	生食 250mL 1袋 ハーセプチン(8mg/kg)	生食 250mL 1袋 ハーセプチン(6mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	休業完了day21			
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)		day15は休業	day15は休業	day15は休業
7 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシコ-75錠服用	カイトリル注ハック3mg 1袋 ファミチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V Rp.2と同時にレスタシコ-75錠服用		休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)				
8 薬剤		生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注(90mg/rl)				
手技	day22は休業	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)				
9 薬剤	休業完了day28						
手技		day21は休業	day21は休業				
10 薬剤		休業完了day28	休業完了day28				
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny073-01 47	ny074-01 48	ny075 49	ny076-01 50	ny077-01 51	ny078-01 52
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	従来通り(シール)	従来通り(シール)	従来通り(シール)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)
プロトコール名	パージェタ(初回)・ハーセプチン (初回) 3weeks	パージェタ(初回)・ハーセプチン 3weeks	パージェタ・ハーセプチン 3weeks	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・アブラキサン・ ハーセプチン	パージェタ・アブラキサン・ ハーセプチン
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
生食	250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可	250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b> 下ルートより	250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b> 下ルートより	250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可 下ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>8mg/kg</b> 下ルートより	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可 下ルートより	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可 下ルートより
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤				カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V フィルターなし
手技	day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
4 薬剤	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	生食100mL ( <b>52mL/mf</b> ) アブラキサン注( <b>260mg/mf</b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL ( <b>52mL/mf</b> ) アブラキサン注( <b>260mg/mf</b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄	生食100mL ( <b>52mL/mf</b> ) アブラキサン注( <b>260mg/mf</b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残液は廃棄
手技				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤				休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技						
6 薬剤						
手技						
7 薬剤						
手技						
8 薬剤						
手技						
9 薬剤						
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						

コード ナンバリング	ny079-01	ny080-01	ny081-01	ny082-01	ny083-01	ny084-01
入院・外来	53	54	55	56	57	58
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パージェタ(初回)・タキソール・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・タキソール・ハーセプチン	パージェタ・タキソール・ハーセプチン	パージェタ(初回)・weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン(初回)	パージェタ(初回)・weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン	パージェタ・weeklyタキソール・アバステン・ハーセプチン
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
薬剤	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可			
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	day1,15	day1,15	day1,15
2 薬剤	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.3と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.3と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.3と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
4 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可	生食 100mL 1瓶 アバステン ( <b>10mg/kg</b> ) 認容性 良→60分→30分へ短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
5 薬剤						
手技	day8	day8	day8	day8	day8	day8
6 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
7 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
8 薬剤				カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>
手技	day15	day15	day15	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
9 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 ファモチジン注20mg 1A デキサート注6.6mg 1V <b>Rp.1と同時にレスタシコ-75錠服用</b>	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
10 薬剤	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>90mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )	生食 500mL 1袋 パクリタキセル注( <b>80mg/㎡</b> )			
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	day21は休業	day21は休業	day21は休業
11 薬剤	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day28	休業完了day28	休業完了day28
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						

コード ナンバリング	ny085-01	ny086-01	ny087-01	ny088-01	ny089-01	ny090-01
	59	60	61	62	63	64
入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
ルート	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
プロトコール名	パージェタ(初回)・タキソテール・ハーセプチン3weeks(初回)	パージェタ(初回)・タキソテール・ハーセプチン3weeks	パージェタ・タキソテール・ハーセプチン3weeks	パージェタ(初回)・ナベルピン・ハーセプチン3weeks(初回)	パージェタ(初回)・ナベルピン・ハーセプチン3weeks	パージェタ・ナベルピン・ハーセプチン3weeks
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
生食	250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可	250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	250mL 1袋 パージェタ 840mg/body	250mL 1袋 パージェタ 420mg/body 認容性 良:60分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 8mg/kg	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 8mg/kg	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン 6mg/kg 認容性 良:90分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)
3 薬剤	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハック3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (75mg/ml) 調製時ボンピング必要	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢
5 薬剤						
手技	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	day8、15は、休業週	day8	day8	day8
6 薬剤	休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で	生食50mL 1瓶 ロゼウス (25mg/ml) 全開で
手技				持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(5分)
7 薬剤				生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用	生食 100mL 1瓶 ルートキープ用
手技				持続点滴末梢	持続点滴末梢	持続点滴末梢
8 薬剤						
手技				day15は、休業週	day15は、休業週	day15は、休業週
9 薬剤				休業完了day21	休業完了day21	休業完了day21
手技						
10 薬剤						
手技						
11 薬剤						
手技						
12 薬剤						
手技						
13 薬剤						
手技						
14 薬剤						
手技						



コード ナンバリング	ny091-01 65	ny092-01 66	ny093-01 67	ny094-01 68	ny095-01 69	ny096-01 70	ny100-01 71
ルート	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来	入院・外来
プロトコール名	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤
手技	day1	day1	day1	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>840mg/body</b>	生食 250mL 1袋 パージェタ <b>420mg/body</b> 認容性 良:60分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 カドサイラ <b>3.8mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢
3 薬剤	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>8mg/kg</b>	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	生食 250mL 1袋 ハーセプチン <b>6mg/kg</b> 認容性 良:90分→30分 短縮可	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	
手技	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	day8,15は、休業週
4 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/㎡</b> )	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/㎡</b> )	生食 250mL 1袋 エンドキサン注 ( <b>600mg/㎡</b> )	休業完了 day21
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(45分)	持続点滴末梢(45分)	
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/㎡</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/㎡</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル ( <b>75mg/㎡</b> ) 開始10分間→125mL/hr その後1hr→250mL/hr 調製時ボンピング必要	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢(約60分)	持続点滴末梢(約60分)	
6 薬剤				生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	生食 50mL 1瓶	
手技	day8	day8	day8	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	
7 薬剤	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	カイトリル注ハッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V				
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day8,15は休業	day8,15は休業	day8,15は休業	
8 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	生食 100mL 1瓶 ゲムシタビン( <b>1250mg/㎡</b> )	休業完了 day21	休業完了 day21	休業完了 day21	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)				
9 薬剤							
手技	day15は休業	day15は休業	day15は休業				
10 薬剤	休業完了 day21	休業完了 day21	休業完了 day21				
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							

コード ナンバリング	ny101-01、ny102-01 72	ny103-01 74	ny116-01 75	ny119-01 76	ny126-01 77	ny132-01 78	ny133-01 79
ルート	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート) (メインフィルターなし)	入院・外来 ケモセーフ
プロトコル名	TCbH(初回)、TCbH	TCb	EC(2weeks)療法	EC(3weeks)療法	キイトルーダ	テセントリク+アブラキサン	CMF療法
投与順序	1 薬剤 生食 250mL 1袋 ハーセプチン 初回、 <b>8mg/kg</b> (90分) 2回目以降、 <b>6mg/kg</b> (30分)	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V	生食 100mL 1瓶 キイトルーダ注( <b>200mg/body</b> )		
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1,15	day1,8
2 薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注( <b>75mg/m<sup>2</sup></b> ) <b>調製時ボンピング必要</b>	生食100mL 1瓶 エビルピシン注( <b>90mg/m<sup>2</sup></b> ) 全開で	生食100mL 1瓶 エビルピシン注( <b>90mg/m<sup>2</sup></b> ) 全開で	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食250mL 1袋 テセントリク( <b>840mg/body</b> ) 認容性 良→2回目以降30分へ 短縮可 下ルートより	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(15分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	5%ブドウ糖 250mL 1袋 ドセタキセル注( <b>75mg/m<sup>2</sup></b> ) <b>調製時ボンピング必要</b>	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注( <b>AUC8</b> ) <b>MAX900mg</b>	生食100mL 1瓶 エンドキサン注( <b>600mg/m<sup>2</sup></b> )	生食100mL 1瓶 エンドキサン注( <b>600mg/m<sup>2</sup></b> )	<b>休業完了day21</b>	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V <b>フィルターなし</b>	生食50mL 1瓶 メントレキセート注( <b>40mg/m<sup>2</sup></b> ) 全開で
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(5分)
4 薬剤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン注( <b>AUC8</b> ) <b>MAX900mg</b>		<b>休業完了day14</b>	<b>休業完了day21</b>		生食100mL ( <b>20mL/m<sup>2</sup></b> ) アブラキサン注( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 <b>上ルートより</b>	生食 100mL 1瓶 フルオウラシル( <b>800mg/m<sup>2</sup></b> ) 全 開で
手技	持続点滴末梢(30分)	day8,15は、休業週				持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
5 薬剤		<b>休業完了day21</b>	イメンド内服	イメンド内服			<b>休業完了day28</b>
手技	day8,15は、休業週					day8	
6 薬剤	<b>休業完了day21</b>	イメンド内服				カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V <b>フィルターなし</b>	エンドキサン錠 100mg/m <sup>2</sup> 14日間
手技						持続点滴末梢(30分)	
7 薬剤	イメンド内服					生食100mL ( <b>20mL/m<sup>2</sup></b> ) アブラキサン注( <b>100mg/m<sup>2</sup></b> ) 生食20mL/Vで溶解 生食の残は、廃棄 day22は、休業週	
手技							
8 薬剤						<b>休業完了day28</b>	
手技							
9 薬剤							
手技							
10 薬剤							
手技							
11 薬剤							
手技							
12 薬剤							
手技							
13 薬剤							
手技							
14 薬剤							
手技							