

コード ナンバリング	bk002-01	bk003-03	bk004-01	bk005-01	bk006-01	bk007-01	bk008-01	bk009-01	bk010-01	bk011-01	bk012-01	
	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ(下ルート)	入院・外来 ケモセーフ・シリンジ	入院・外来 ケモセーフ	
プロトコール名	ビダーザ(静注)	CHOP	リツキサン	THP-COP	ダウノマイシン単剤	サイメリン単剤	ジェムザール	ベルケイド単回投与	ABVd療法	DBd療法 1~8サイクル(1~24週)	DBd療法(ダラザレックス単剤) 9サイクル以降(25週以降)	
投与順序	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	1 薬剤	
薬剤	カイトリル注バッグ3mg 1袋	アロキシ注バッグ 1袋	生食 100mL 1瓶 ソル・コーテフ100mg 1V 内服、リツキサン前投薬あり。要確認。	カイトリル注バッグ3mg 1袋	クラニド注バッグ3mg 1袋	カイトリル注バッグ3mg 1袋 メインルート	カイトリル注バッグ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	ベルケイド(1.3mg/nf) 生食20mL 1A シリンジ調製	ダカルバジンは消灯して調製出来る限り調製時間は短くし、投与直前に調製完了すること。下ルートは遮光後で覆うこと	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 3V Rp.1と同時にレスタミンコウ・カロナール5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 3V Rp.1と同時にレスタミンコウ・カロナール5錠服用	
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	皮下投与	day1,15	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	
2 薬剤	生食50mL 1瓶 ビダーザ (75mg/nf) 注射用水20mL 1A 蒸留水は溶解用	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/nf) MAX 2mg/body	生食 500mL 1袋 リツキサン (375mg/nf) 開始30分→50mL/hr 2回目以降、忍容性…	生食 500mL 1袋 リツキサン (375mg/nf) 開始30分→50mL/hr 2回目以降、忍容性…	5%ブドウ糖100mL 1瓶 ピノルビン (80mg/nf)	生食100mL 1瓶 ダウノマイシン (1mg/kg)	5%ブドウ糖100mL 1瓶 サイメリン (70mg/nf) 上ルートより	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/nf)	休業完了day7	アロキシ注バッグ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食 500mL 1袋 ダラザレックス (16mg/kg) (3回目以降) 開始~1時間 100ml/h…	生食 500mL 1袋 ダラザレックス (16mg/kg) (3回目以降) 開始~1時間 100ml/h…
手技	持続点滴末梢(10分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	皮下投与	
3 薬剤	入院: Day1~Day7 外来: Day1~Day5	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピシン (50mg/nf)	休業完了day1	生食 500mL 1袋 エンドキシサン (750mg/nf)	休業完了day1	休業完了day42	day1~day15の計3回	ステロイド処方確認 (処置入力)	生食 100mL 1瓶 ドキシソルピシン(25mg/nf) Nsは投与開始15分後ケモ調製室に連絡→調製開始 上ルートより	ベルケイド(1.3mg/nf) 生食20mL 1A シリンジ調製	休業完了day7	
手技		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	皮下投与	
4 薬剤	休業完了day28	生食 500mL 1袋 エンドキシサン (750mg/nf)	内服、前投薬有り。確認。 ロキソプロフェン60mg1T、ホラミン2mg1T、サイトチン200mg1T 余開で 静脈注射観察に	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/nf) MAX 2mg/body 余開で 静脈注射観察に	生食 50mL 1瓶 オンコピン (1.4mg/nf) MAX 2mg/body 余開で 静脈注射観察に	調製後、5%ブドウ糖を遮光 (ルートは基本遮光しなくて良い)	生食は溶解用 1.2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の 2.5mLシリンジに調製	生食 50mL 1瓶 プレオ (9mg/nf) 全開で 上ルートより	生食 500mL 1袋 ダラザレックス (16mg/kg) (3回目以降) 開始~1時間 100ml/h…	生食 500mL 1袋 ダラザレックス (16mg/kg) (3回目以降) 開始~1時間 100ml/h…	内服、前投薬有り カロナール200mg5T、レスタミンコウ10mg5T	
手技		持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	
5 薬剤	ビダーザを調製した時間を シールに書くこと!		休業完了day21				休業完了day7		生食 50mL 1瓶 エクザール(6mg/nf) 全開で 上ルートより	内服、前投薬有り カロナール200mg5T、レスタミンコウ10mg5T	投与スケジュールに関して 別紙有り	
手技		day8は休業							静脈注射観察に			
6 薬剤		休業完了day14		day1から5日間プレドニン内服					生食 100mL 1瓶 ダカルバジン(250mg/nf) ルート刺入部まで遮光後投与 ベッドサイドの消灯 持続点滴末梢(30分)	ベルケイドの生食は溶解用 1.2mL/Vで溶解 ごく少量のため通常の 2.5mLシリンジに調製		
手技									持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)		
7 薬剤		CHOPは3週間休業する									投与スケジュールに関して 別紙有り	
手技									day8,22は休業			
8 薬剤		インド内服							休業完了day28			
手技												
9 薬剤									インド内服			
手技												
10 薬剤												
手技												