

コード ナンバリング	ng002-01 2	ng003-01 3	ng004-01 4
	入院	入院	入院
	ケモセーブ(下ルート)	ケモセーブ(下ルート)	従来通り(シール)
プロトコール名	ICE療法	HD-MTX療法	アバスタチン(10mg/kg)
投与順序	1 薬剤 Rp.1のソルデム1は入院予約注射(カート)で払い出し ウロミキサンは薬剤師が調製	day1のRp.8~14(12時以降投与分)は調製室から払い出し。その他は入院予約注射(カート)で払い出し。	生食 100mL 1瓶 アバスタチン (10mg/kg) 認容性 良→60分→30分へ短縮可
手技	day1~5		持続点滴末梢(90分)
2 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより	別紙	休薬完了day14
手技	持続点滴末梢(210分)		
3 薬剤	グラニセロン注キット3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルートより	生食500mL 1袋 マルチセット (3500mg/ml) メイロン20mL 1A 全量500mL	
手技	持続点滴側管(30分)		
4 薬剤	生食500mL 1袋 エトポシド注(60mg/ml) 上ルートより	休薬完了day14	
手技	持続点滴末梢(120分)		
5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミキサン注 (270mg/ml) Rp.5と同時に 下ルートより		
手技	持続点滴末梢(30分)		
6 薬剤	生食 500mL 1袋 イホマイド (0.9g/ml) Rp.4と同時に 上ルートより		
手技	持続点滴末梢(120分)		
7 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン(20mg/ml) 上ルートより		
手技	持続点滴末梢(120分)		
8 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミキサン注 (270mg/ml) メインルートより		
手技	持続点滴末梢(30分)		
9 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルートより		
手技	持続点滴末梢(90分)		
10 薬剤	生食 100mL 1瓶 ウロミキサン注 (270mg/ml) メインルートより		
手技	持続点滴末梢(30分)		
11 薬剤	ソルデム3AG 500mL 1袋 メインルートより		
手技	持続点滴末梢(5時間30分)		
12 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルートより		
手技	持続点滴末梢(6時間)		
13 薬剤	休薬完了day28		
手技			
14 薬剤			
手技			
15 薬剤			
手技			