コード ナンバリング	gi002-01 2	gi003-01 3	gi004-01 4	gi005-01 5	gi006-01 6	gi007-01 7	gi008-01 8		gi009-01 9	
	入院 ・ 外来	入院	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院 ・ 外来	入院		入院	
	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ(下ルート)	
プロトコール名	weekly タキソテール(放射線併用)	Weekly CDDP(40mg/㎡)	Triweeklyタキソテール	オプジーボ	アービタックス(初回)	アービタックス	FP+アービタックス療法(初回)		FP+アービタックス療法	
投与順序 1 薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服 (Day2～4)	カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 オプジーボ注(**240mg/body**)	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	**day1は10時に投与開始予定**		**day1は10時に投与開始予定**	
手技	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day2～4	day1	day2～4
2 薬剤	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL 1袋 ドセタキセル (**10mg/㎡**) **服薬時ポンピング必要**	ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルート**	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500mL 1袋 ドセタキセル (**60mg/㎡**) **服薬時ポンピング必要**	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食500mL 1袋 アービタックス(**400mg/㎡**) 全量を500mLに	生食250mL 1袋 アービタックス(**250mg/㎡**) 全量を250mLに	アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V **メインルート**	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V **メインルート**	アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V **メインルート**	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V **メインルート**
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	**休薬完了day7**	ソルデム1 500mL 1袋 **メインルート**		**休薬完了day14**	生食 250mL 1袋	生食 250mL 1袋	生食500mL 1袋 アービタックス(**400mg/㎡**) 全量500mL Rp.3と同時 **上ルートより**	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル (**800mg/㎡**) Rp.3と同時 **下ルートより**	生食250mL 1袋 アービタックス (**250mg/㎡**) 全量250mL Rp.3と同時 **上ルートより**	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(**800mg/㎡**) Rp.3と同時 **下ルートより**
手技		持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休薬週		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)
4 薬剤		グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ 1袋 デキサート注6.6mg 1V **メインルート**	**休薬完了day21**		**休薬完了day7**	**休薬完了day7**	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 **下ルートより**	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 **メインルートより**	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 **下ルートより**	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 **メインルートより**
手技		持続点滴末梢(30分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤		生食500mL 1袋 ランダ(**40mg/㎡**) 全量を500mLに **上ルートより**					生食 500mL 1袋 **メインルートより**	ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**	生食 500mL 1袋 **メインルートより**	ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**
手技		持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤		マンニットール300mL 1瓶 **メインルート**					生食 500mL 1袋 ランダ (**80mg/㎡**) 全量を500mLに **上ルートより**		生食 500mL 1袋 ランダ (**80mg/㎡**) 全量を500mLに **上ルートより**	
手技		持続点滴末梢(60分)					持続点滴末梢(120分)	day8,15	持続点滴末梢(120分)	day8,15
7 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルート**					生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A **下ルートより**	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用	生食 20mL 1A ラシックス注20mg 1A **下ルートより**	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服用
手技		持続点滴末梢(120分)					静脈注射	持続点滴末梢(30分)	静脈注射	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤		ソルデム1 500mL 1袋 **メインルート**					生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(**800mg/㎡**) Rp.8と同時 **下ルートより**	生食250mL 1袋 アービタックス(**250mg/㎡**) 全量を250mLに **上ルートより**	生食 500mL 1袋 フルオロウラシル(**800mg/㎡**) Rp.8と同時 **下ルートより**	生食250mL 1袋 アービタックス(**250mg/㎡**) 全量を250mLに **上ルートより**
手技		持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)
9 薬剤		ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルート**					ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 **メインルートより**	生食 250mL 1袋 **メインルート**	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 **メインルートより**	生食 250mL 1袋 **メインルート**
手技		持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)
10 薬剤		**休薬完了day7**					ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**	**休薬完了day21**	ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**	**休薬完了day21**
手技							持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	
11 薬剤		イメンド内服					ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**		ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**	
手技							持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	
12 薬剤							ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**		ソルデム3A 500mL 1袋 **メインルートより**	
手技							持続点滴末梢(120分)		持続点滴末梢(120分)	
13 薬剤										
手技										
14 薬剤							イメンド内服		イメンド内服	
手技										

gi010-01	gi011-01	gi012-01	gi013-01		gi014-01	gi015-01	gi016-01	gi017-01
10	11	12	13		14	15	16	17
入院　・　外来	入院　・　外来	入院　・　外来	入院		入院　・　外来	入院　・　外来	入院　・　外来	入院
ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ(下ルート)		ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ	ケモセーフ
Biweeklyタキソテール	タキソール　weekly(100mg/㎡)	Weekly CDDP(40mg/㎡)SH	術前DCF療法		アービタックス+パクリタキセル（初回）	アービタックス+パクリタキセル	キイトルーダ	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+5-FU
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋 デキサート注6.6mg　1V	カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋 ファモチジン注20mg　1A デキサート注6.6mg　2V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠服	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服 (Day2～4)	イメンド内服		カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋 ファモチジン注20mg　1A デキサート注6.6mg　1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠	カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋 ファモチジン注20mg　1A デキサート注6.6mg　1V Rp.1と同時にレスタミンコーワ5錠	生食　100mL　1瓶 キイトルーダ注(**200mg/body**)	イメンド内服
持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1	day1	day2・3	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1
5%ブドウ糖500mL　1袋 ドセタキセル　(**35mg/㎡**) **開始時ポンピング必要**	生食　500mL　1袋 パクリタキセル注(**100mg/㎡**)	アロキシ注バッグ　1袋 デキサート注6.6mg　1.5V 投与中に水分1L摂取	生食　500mL　1袋 **メインルートより**	生食　100mL　1瓶 デキサート注6.6mg　1V **メインルートより**	生食500mL　1袋 アービタックス(**400mg/㎡**) 全量を500mLに	生食250mL　1袋 アービタックス(**250mg/㎡**) 全量を250mLに	生食　50mL　1瓶 メインルート 全開で	生食　100mL　1瓶 キイトルーダ注(**200mg/body**)
持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(30分)
day8は、休薬週	**休薬完了day7**	ラクテック500mL　1袋 硫酸Mg　8mEq	生食　500mL　1袋 フルオロウラシル(**750mg/㎡**) Rp.1と同時 **下ルートより**	生食　500mL　1袋 フルオロウラシル(**750mg/㎡**) **下ルートより**	生食　250mL　1袋	生食　250mL　1袋	**休薬完了day21**	アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋 デキサート注6.6mg　1V
		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(30分)
day15	**週1回投与を6回施行し、2週間休薬を1コースとし、反復**	マンニットールS　200mL	生食　500mL　1袋 硫酸Mg補正液　1A **メインルートより**	ラクテック500mL　1袋 **メインルートより**	生食　250mL　1袋 パクリタキセル注(**80mg/㎡**)	生食　250mL　1袋 パクリタキセル注(**80mg/㎡**)		ソルデム3A500mL　1袋 カルボプラチン　(**AUC　4**) **MAX600mg**
		持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)		持続点滴末梢(120分)
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋 デキサート注6.6mg　1V		生食500mL　1袋 ランダ(**40mg/㎡**) 全量を500mLに	アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋 デキサート注6.6mg　1．5V **メインルートより**	ソルデム3A　500mL　1袋 **メインルートより**	**休薬完了day7**	**休薬完了day7**		生食　500mL　1袋 フルオロウラシル(**800mg/㎡**)
持続点滴末梢(30分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)				持続点滴末梢(24hr)
5%ブドウ糖500mL　1袋 タキソテール　(**35mg/㎡**)		ラクテック500mL　1袋	生食　250mL　1袋 ドセタキセル　(**70mg/㎡**) Rp.4終了後 **上ルートより** **開始時ポンピング必要**	ラクテック500mL　1袋 **メインルートより**				
持続点滴末梢(90分)		持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)				day2～4
day22は、休薬週		**休薬完了day7**	生食　500mL　1袋 ランダ　(**70mg/㎡**) 全量を500mLに **上ルートより**	day4・5				生食100mL　1瓶 デキサート注6.6mg　1V
			持続点滴末梢(120分)					持続点滴末梢(30分)
休薬完了day28		イメンド内服	ラクテック500mL　1袋 ランダ終了後 **メインルートより**	生食　500mL　1袋 フルオロウラシル(**750mg/㎡**) **下ルートより**				生食　500mL　1袋　7 ルオロウラシル(**800mg/㎡**)
			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)				持続点滴末梢(24hr)
			ソルデム3A　500mL　1袋 **メインルートより**	ラクテック500mL　1袋 **メインルートより**				**休薬完了day21**
			持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)				
			マンニットール　300mL　1瓶 **メインルートより**	**休薬完了day21**				
			持続点滴末梢(60分)					

gi018-01

18

入院

ケモセーフ(下ルート)

キイトルーダ+FP療法

イメンド内服	
day1	day2～4
生食100mL　1袋 キイトルーダ（**200mg/body**） **上ルートより**	生食100mL　1瓶 デキサート注6.6mg　1V **メインルート**
持続点滴末梢（30分）	持続点滴末梢（30分）
アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋 デキサート注6.6mg　1.5V **メインルート** **経口補水液(OS1)1L/Day摂取**	生食　500mL　1袋 フルオロウラシル　（**800mg/㎡**） **下ルートより**
持続点滴末梢（30分）	持続点滴末梢（24hr）
生食　500mL　1袋 硫酸Mg　8mEq KCl注　10mEq **メインルートより**	**休薬完了day21**
持続点滴末梢（60分）	
マンニットール　200mL **メインルート**	
持続点滴末梢（30分）	
生食　500mL　1袋 ランダ　（**80mg/㎡**） 全量を500mLに **上ルートより**	
持続点滴末梢（60分）	
生食　500mL　1袋 KCl注　10mEq **メインルートより**	
持続点滴末梢（60分）	
生食　500mL　1袋 フルオロウラシル（**800mg/㎡**） Rp.8と同時 **下ルートより**	
持続点滴末梢（24hr）	